


Найцікавіші дерева парків



Ялівець звичайний



Ялівець
звичайний
найпоширеніший
вид.

Плоди ялівцю



Плоди шишкотягоди м'ясисті, соковиті. При вживанні ялівцевих шишкотягод, ротова порожнина, шлунок, очищається від бактерій, поліпшується травлення, поліпшується склад крові.

Яловець віргінський



Вироби з ялівцю віргінського



Шампунь




Гель



Ефірна олія



Подушка



Валик

Кедр ліванський



Саджанець кедр

Кедр ліванський



Ліванський кедр — один із символів Лівану . Він зображений на прапорі і гербі країни.

Прапор Лівану




Герб Лівану



Шишки та насіння кедр



Кедр сибірський (Сосна кедрова сибірська)



Тис ягідний




**Зріз 27-річного
деревя тису**

Перші дерева тису на планеті появились 200 мільйонів років тому...

1200-літній тис на горі Ай-Петрі в Криму



Тис в ландшафтному дизайні




Таксодій дворядний



Таксодій дворядний або болотний кипарис звичайний (Taxodium distichum) - листопадне хвойне дерево роду Таксодіум сімейства Кипарисові. Інші назви - болотний кипарис дворядний, Лисий кипарис, таксодій звичайний, Таксодіум звичайний.

Корені таксодію виходять на поверхню (пневматофори)



Плоди таксодію



Плоди – округлі шишки, до 2,5 см в діаметрі, з щільно зімкнутими щитоподібними, спочатку зеленими, а потім коричневими, відвалюються лусками, містять по два насіння.

Таксодій восени



Метасеквоя китайська в Київському ботанічному саду ім. Гришка



Однодомне листопадне дерево з нерівномірно широкопірамідальною кроною і струнким стовбуром, висотою може досягати 35 м при діаметрі стовбура до 2 м. Вік деяких з виявлених рослин перевищує 600 років.

Метасеквоя

Жіночі шишки




Чоловічі шишки



Метасеквоя


Стовбур метасеквої



Зріз 25-річного дерева



Гілочка метасеквої



Гілочка таксодію

Метасеквоя восени



Секвоя



Секвоя — єдиний живий вид деревних рослин з роду секвоя родини кипарисових. Представники цього виду є найвищими деревами на Землі.



Секвоя — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Закарпатської області. Розташована в межах Рахівського району Закарпатської області, на північний схід від села Луг.




1 cm

Тунель, зроблений в секвої



У тунель, зроблений в такому дереві, вільно в'їжджає екіпаж, а на пні можуть танцювати шістнадцять пар і поміщається оркестр.

Тсуга канадська



Окраска нижньої частини хвої тсуги канадської



Шишки тсуги канадської



Гай тсуги



Тсуґа в композиціях



Псевдотсуга Мензіса, дугласія



Плід Молоді шишки зелені або пурпурові, пізніше – світло-коричневі, продовгуватояйцевидні, довжиною до 10 см, сидять на коротких ніжках, трохи повислі.

Псевдотсуга Мензіса



© Vladimir d'Ar, 2019



Квітка Привабливу особливість цим деревам щорічно додають шишки, які розпускаються, наче квітки, кожного літа. Чоловічі – циліндричної форми колоски помаранчево-жовті, 12–23 мм довжиною, розміщені в два ряди гребінчасто, більш або менш під прямим кутом, на верхівках маленьких пагонів. Жіночі – зеленувато-рожеві або пурпурові, крупніші.

Псевдотсуга Мензіса



Ліквідамбар смолоносний (Амброве дерево)



Ліквідамбар смолоносний - дуже декоративне в осінній період. Інша назва цієї рослини - ліквідамбар стіраксовий.

Стіракс, ароматна смола, виділяється з пошкоджень на корі.

Ліквідамбар (Амброве дерево)



Ліквідамбар



Плоди



Бобовник або Золотий дощ



Бобовник (Золотий дощ)



Насіння бобовника



Тюльпанове дерево



Родова назва означає «дерево-ліра». Так його назвали за оригінальну форму листків, притаманну тільки йому. А тюльпанним його називають за пахучі квіти жовтогарячого кольору, які зовні нагадують тюльпани.



Тюльпанове дерево восени



Катальпа



Катальпа - дуже гарне дерево, яке привертає увагу з ранньої весни і до пізньої осені. Її батьківщина - південно-східна частина Північної Америки, де вона найчастіше росте по берегах річок. У 18 столітті катальпа була завезена до Європи.

Катальпа квітує



Плоди катальпи



Платан



Платан —єдиний сучасний рід родини платанових (*Platanaceae*). На Кавказі відомий як чинар, а в Північній Америці як сикамор .

Листя платана





Квітки розкриваються дещо пізніше, ніж листки; зібрані в одностатеві кулястої форми головки на довгих звисаючих квітоніжках. Чоловічі (тичинкові) жовтуватого кольору квітки – в пазушних, маточкові (жіночі) червоні – в значно більших кінцевих суцвіттях. Запилюються вітром.


Плід платана



Платан



Платан



Алея платанів у Стрийському парку м. Львова



Гінкго Білоба



Гінкго дволопатеве рід унікальних листопадних голонасінних рослин. Він включає цілу низку викопних видів і тільки один сучасний вид гінкго дволопатеве — високе (до 40 м) дерево з розлогою кроною і товстим (до 1 м) стовбуром



Гінкго в Київському ботанічному саду



Гінкго квітує



Плоди Гінкго



Гінкго восени



Ліщина деревовидна



Горіх ведмежий або **Ліщина деревовидна** (*Corylus colurna*) - листопадне дерево з роду Ліщина, родини Березових. Горіх ведмежий використовується як горіхоплідна культура, а також як підщепа для культурних сортів фундука.

Ліщина деревовидна (Ведмежий горіх)



Магнолія Кобус



Магнолія Кобус -
дерево пірамідальної
форми, висота якого
сягає 12 метрів. В
кінці весни воно
покривається білими,
квітами.

Магнолія Суланжа






Магнолія оберненояцевидна



Магнолія трипелюсткова



Магнолія лікарська



Магнолія великоквіткова



Магнолія оголена



Магнолія Лілієцвітна



Магнолія кримська



Каліфорнійська жовта магнолія



Магнолія



Багряник японський (карамельне, пряничне дерево)



У деяких країнах багряник японський називають «карамельним деревом», це пов'язано саме з запахом, що з'являються під час пожовтіння листя.

Багряник японський



Скумпія (парикове дерево)



Високий кущ або деревце родини сумахових. Пагони зелені або фіолетові, товстуваті, на зрізі виділяють слабо помітний молочний сік. Цвіте у травні—червні.

Скумпія (парикове дерево)



Гледичія триколючкова



Високе дерево родини бобових (Fabaceae). Батьківщиною є Північна Америка. Акліматизована в Україні. Рослина до 40 м заввишки, з темно-бурою корою і розлогою ажурною кроною. На гілках міцні прості або розгалужені колючки (3–7, а інколи й 30 см завдовжки).

Колючки гледичії на стовбурі



Гледичія квітне



Плоди гледичії



Плід сплюснутий, трохи зігнутий біб (20–40 см завдовжки, 2,5–4 см завширшки). Плоди висячі, на довгій ніжці, майже не розкриваються, темно-коричневі, шкірясті. Насінини (близько 15 мм завдовжки) овальні, темно-коричневі, голі, блискучі.

Айлант найвищий (Китайський ясен)



Айлант найвищий — вид дерев з роду айлант родини симарубових. Батьківщиною айланта найвищого є Китай, де дерево здавна культивується для розведення айлантового шовкопряда.

Дерево швидко росте, досягаючи висоти 20-30 м.



Айлант найвищий



Квітки одностатеві, у волотистих суцвіттях завдовжки до 20 см. Плід крилатка. Насіння отруйне.

Вяз (ільм, берест, карагач)



В'язи поширені по всій Україні, особливо в Лісостепу і Степу. Види в'язу відомі під назвами: **б́ерест, ільм, карагач, бересток.**

Вяз стрижка



Квітуючий вяз



Вяз плоди крилатий горішок



Вяз восени



Каркас західний (залізне дерево)



Деякі види залізного (кам'яного) дерева використовуються в якості їжі метеликами і гусеницями. З плодів виготовляють намиста і амулети. Священним це дерево вважається в Самарії та Юдеї, де його плодам приписують цілющі і навіть магічні властивості.

Каркас західний, плоди



Робінія (псевдоакація)



Усі частини робінії звичайної, окрім квіток, отруйні, найвища концентрація токсинів спостерігається в корі та насінні.

Цвітіння відбувається у травні-червні.

З листя і кори отримують жовту фарбу.

Квіти робінії



Дуб червоний




Дуб червоний (*Quercus rubra*), синонім дуб північний (*Quercus borealis*) — дерево родини букових (до 30-35 м заввишки) з густою, широкояйцевидною кроною, міцними гілками і товстим прямим стовбуром.

Ясень золотистий



Рід ясен налічує
близько 65 видів, в
Україні з них ростуть
дев'ять,

Горіх чорний



Кубометр деревини такого горіха коштує до 4 тисяч євро.

Плоди чорного горіха використовують у харчовій промисловості. Вони є смачнішими та кориснішими навіть за волоські горіхи. Щоправда, ці горіхи мають дуже тверду шкірку, тож для того щоб їх дістати – треба мати спеціальне обладнання.

Плоди горіха чорного



Горіх чорний, продукти



Варення



Сік — допомагає зупинити кров, і сприяють швидкому відновленню шкірного покриву; **Таблетки** — при їх виготовленні використовують листя чорного горіха. Засіб добре допомагає при застуді. **Біологічно активні добавки** допомагають зміцнити організм; **Мазі** — застосовуються при різних шкірних захворюваннях; **Свічки** — застосовуються в гінекології для відновлення мікрофлори, також ефективні при геморої і тріщинах. **Відвар** готують з 5 грам дрібно порізаного сушеного листа, який заливають 200 мл води, поки рідина не потемніє. Такий засіб можна використовувати як компрес при діатезі, полоскати ним горло при інфекційних захворюваннях і обполіскувати волосся для їх зміцнення.

Яблуня Недзвецького



Яблуня Недзвецького декоративна цілий рік. Розпускаючись листя має незвичайний пурпурний колір, який з часом змінюється на зелений. Під час цвітіння дерево густо вкривається червоними бутонами, які розкриваються дуже мальовничими, яскраво-пурпуровими квітками.

Яблуня Недзвецького, квіти , плоди



Яблуня Недзвецького



Сумах оленерогий (оцтове дерево)



Сумах — невеликі дерева, які можуть досягати висоти 1-10 метрів. Квіти в щільних мітелках; кожна квітка дуже маленька, зеленувата, молочно-біла або червона, з п'ятьма пелюстками. Плоди утворюють щільні скупчення червонуватих кістянок.

Сумах оленерогий



Клокичка периста



Клокичка периста



Джонжолі





Сніжноягідник білий



Плоди сніжноягідника



Калина гордовина



Калина гордовина



Калина гордовина ягоди і цвіт



Калина гордовина ягоди



Дякую за увагу!

